

# Estatística Descritiva 2

Prof. Lorí Viali, Dr.

[viali@ufrgs.br](mailto:viali@ufrgs.br)

<http://www.ufrgs.br/~viali/>



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



## Tratamento de grandes conjuntos de dados



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



### Grande Conjuntos de Dados

- Organização;
- Resumo;
- Apresentação.

Amostra ou População



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



## Dados não organizados



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



## Dados Brutos Variável qualitativa



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



### Defeitos em uma linha de produção

Lascado	Menor
Desenho	Maior
Torto	Lascado
Desenho	Esmalte
Torto	Esmalte
Lascado	Lascado
Torto	Desenho
Maior	Menor
Menor	Maior
Desenho	Torto
.....	.....



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística




# Dados organizados em uma distribuição de freqüências

**\* Variável qualitativa \***

## Distribuição de freqüências

Defeito	Freqüência	%
Desenho	71	14,20
Esmalte	95	19,00
Lascado	97	19,40
Maior	70	14,00
Menor	83	16,60
Torto	57	11,40
Trincado	27	5,40
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>100</b>

# Freqüências (Tipos)




## Freqüências: representação

Valores	$f_i$	$F_i$	$fr_i$	$fr_i$	$Fr_i$
0	60	60	0,30	30	30
1	50	110	0,25	25	55
2	40	150	0,20	20	75
3	30	180	0,15	15	90
4	10	190	0,05	5	95
5	6	196	0,03	3	98
6	4	200	0,02	2	100
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>—</b>	<b>1,00</b>	<b>100</b>	<b>—</b>

# Representação gráfica

## Diagrama de torta ou pizza (Pie Chart)

### Defeitos em uma linha de produção



# Dados Brutos

## Variável discreta

### Número de irmãos dos alunos da turma G – Pro. & Estatística - UFRGS - 2004/01

0	1	1	6	3	1	3	1	1	0
4	5	1	1	1	0	2	2	4	1
3	1	2	1	1	1	1	5	5	6
4	1	1	0	2	1	4	3	2	2
1	0	2	1	1	2	3	0	1	0

## Distribuição de frequências por ponto ou valores


Distribuição de frequências **por ponto ou valores** da variável: **“Número de irmãos dos alunos da turma G”** da disciplina: Probabilidade e Estatística UFRGS - 2004/01.

Nº de irmãos	Nº de alunos
0	7
1	21
2	8
3	5
4	4
5	3
6	2
<b><math>\Sigma</math></b>	<b>50</b>

# Representação gráfica

## \* Diagrama de colunas simples \*

Diagrama de colunas simples da variável: **Número de irmãos dos alunos da turma G** Disciplina: Probabilidade e Estatística, UFRGS - 2004/01



## Resumo de uma Distribuição de frequências por ponto ou valores

## Medidas de tendência ou posição central

### A média Aritmética

Neste caso, a média é dada por:

$$\bar{x} = \frac{f_1 \cdot x_1 + f_2 \cdot x_2 + \dots + f_k \cdot x_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n}$$

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$f_i \cdot x_i$
0	7	0
1	21	21
2	8	16
3	5	15
4	4	16
5	3	15
6	2	12
$\Sigma$	<b>50</b>	<b>95</b>

A média será, então:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n} = \frac{95}{50} = 1,90 \text{ irmãos}$$

## A Mediana

Como  $n = 50$  é par, tem-se:

$$m_e = \frac{X_{n/2} + X_{(n/2)+1}}{2} = \frac{X_{50/2} + X_{(50/2)+1}}{2} =$$

$$= \frac{X_{25} + X_{26}}{2} = \frac{1+1}{2} = 1 \text{ irmão}$$

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$F_i$
0	7	7
1	21	28
2	8	36
3	5	41
4	4	45
5	3	48
6	2	50
$\Sigma$	<b>50</b>	—

Total de dados  
 $n = 50$   
(par)

Metade dos dados  
 $n/2 = 25$

## A Moda

$m_o =$  valor(es) que mais se repete(m)

## Exemplo

$x_i$	$f_i$
0	7
1	21
2	8
3	5
4	4
5	3
6	2
$\Sigma$	50

Pois ele se repete mais vezes

# Medidas de dispersão ou variabilidade

## A Amplitude

$$h = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

$$h = 6 - 0 = 6 \text{ irmãos}$$

## O Desvio Médio

Neste caso, o dma será dado por:

$$\begin{aligned} \text{dma} &= \frac{f_1|x_1 - \bar{x}| + f_2|x_2 - \bar{x}| + \dots + f_k|x_k - \bar{x}|}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \\ &= \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{n} \end{aligned}$$

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$f_i x_i - \bar{x} $
0	7	$7 \cdot  0 - 1,90  = 13,30$
1	21	$21 \cdot  1 - 1,90  = 18,90$
2	8	$8 \cdot  2 - 1,90  = 0,80$
3	5	$5 \cdot  3 - 1,90  = 5,50$
4	4	$4 \cdot  4 - 1,90  = 8,40$
5	3	$3 \cdot  5 - 1,90  = 9,30$
6	2	$2 \cdot  6 - 1,90  = 8,20$
$\Sigma$	<b>50</b>	<b>64,40</b>

O dma será, então:

$$\text{dma} = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{64,40}{50} = 1,29 \text{ irmãos}$$

## A Variância

Neste caso, a variância será:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{f_1(x_1 - \bar{x})^2 + f_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_k(x_k - \bar{x})^2}{n} = \\ &= \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$f_i x_i^2$
0	7	$0^2 \cdot 7 = 0$
1	21	$1^2 \cdot 21 = 21$
2	8	$2^2 \cdot 8 = 32$
3	5	$3^2 \cdot 5 = 45$
4	4	$4^2 \cdot 4 = 64$
5	3	$5^2 \cdot 3 = 75$
6	2	$6^2 \cdot 2 = 72$
$\Sigma$	<b>50</b>	<b>299</b>

A variância será, então:

$$s^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{299}{50} - 1,90^2 = 2,3700 \text{ irmãos}^2$$

## O Desvio Padrão

O desvio padrão será dado por:

$$s = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{2,3700} = 1,5395 \cong 1,54 \text{ irmãos}$$

## O Coeficiente de Variação

Dividindo a média pelo desvio padrão, tem-se o coeficiente de variação:

$$g = \frac{1,539480}{1,90} = 81,03 \%$$

# Dados Brutos

# Variável contínua

Idade (em meses) dos alunos da turma G da disciplina: Probabilidade e Estatística UFRGS - 2004/01

276 245 345 240 270 310 368  
334 268 288 336 299 236 239 355 330  
287 344 300 244 303 248 251 265 246  
240 320 308 299 312 324 289 320 264  
252 298 315 255 274 264 263 230 303  
369 247 266 275 281 230 234



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



## Distribuição de frequências por classes ou intervalos



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística

**Distribuição por classes ou intervalos da variável “idade dos alunos da turma G” da disciplina: Probabilidade e Estatística da UFRGS - 2004/01**



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



Idades	Número de alunos
230  --- 250	12
250  --- 270	9
270  --- 290	8
290  --- 310	7
310  --- 330	6
330  --- 350	5
350  --- 370	3
<b>Total</b>	<b>50</b>



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística

## Representação gráfica \* Histograma \*



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística




Histograma de frequências da variável “**Idade dos alunos da turma G**” de Probabilidade e Estatística da UFRGS - 2004/01



Prof. Lorí Viali, Dr. - UFRGS - Instituto de Matemática - Departamento de Estatística





# Medidas

Antes de apresentar as medidas, i. é, representantes do conjunto, é necessário estabelecer uma notação para alguns elementos da distribuição.

# Simbologia

- $x_i$  = ponto médio da classe;
- $f_i$  = frequência simples da classe;
- $li_i$  = limite inferior da classe;
- $ls_i$  = limite superior da classe;
- $h_i$  = amplitude da classe.

## O Ponto Médio da Classe

$x_i$	$f_i$	$x_i$
230  --- 250	12	240
250  --- 270	9	260
270  --- 290	8	280
290  --- 310	7	300
310  --- 330	6	320
330  --- 350	5	340
350  --- 370	3	360
$\Sigma$	<b>50</b>	—

# Medidas de tendência ou posição central

## A Média da Distribuição

$x_i$	$f_i$	$f_i \cdot x_i$
240	12	2880
260	9	2340
280	8	2240
300	7	2100
320	6	1920
340	5	1700
360	3	1080
$\Sigma$	<b>50</b>	<b>14260</b>

## Exemplo

A média será:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n} = \frac{14260}{50} = 285,20 \text{ meses}$$

## A Mediana

Neste caso, utilizam-se as frequências acumuladas para identificar a classe mediana, i. é, a que contém o(s) valor(es) central(is).

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$F_i$
230 --- 250	12	12
250 --- 270	9	21
270 --- 290	8	29
290 --- 310	7	36
310 --- 330	6	42
330 --- 350	5	47
350 --- 370	3	50
$\Sigma$	<b>50</b>	—

Total de dados  
 $n = 50$   
(par)

Metade dos dados  
 $n/2 = 25$

Portanto, a classe mediana é a terceira. Assim  $i = 3$ . A mediana será obtida através da seguinte expressão:

$$m_e = l_i + h_i \left[ \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right] = 270 + 20 \left[ \frac{\frac{50}{2} - 21}{8} \right] =$$

$$= 270 + 20 \left[ \frac{50 - 42}{8} \right] = 270 + 20 \cdot \frac{8}{8} = 280 \text{ meses}$$

## A Moda

Neste caso é preciso inicialmente apontar a classe modal, i. é, a de maior frequência. Neste exemplo é a primeira com  $f_i = 12$ . Assim  $i = 1$ .

## Exemplo

i	$x_i$	$f_i$
1	230 --- 250	12
2	250 --- 270	9
3	270 --- 290	8
4	290 --- 310	7
5	310 --- 330	6
6	330 --- 350	5
7	350 --- 370	3
—	$\Sigma$	<b>50</b>

Classe modal, pois  $f_i = 12$ .

Portanto a moda poderá ser obtida através de uma das seguintes expressões:

### Crítério de King:

$$m_o = l_i + h_i \left[ \frac{f_{i+1}}{f_{i-1} + f_{i+1}} \right] = 230 + 20 \cdot \left[ \frac{9}{0 + 9} \right] =$$

$$= 230 + 20 \cdot \left[ \frac{9}{9} \right] = 250 \text{ meses}$$

### Crítério de Czuber:

$$m_o = l_i + h_i \left[ \frac{f_i - f_{i-1}}{2 \cdot f_i - (f_{i-1} + f_{i+1})} \right] =$$

$$= 230 + 20 \cdot \left[ \frac{12 - 0}{2 \cdot 12 - (0 + 9)} \right] =$$

$$= 230 + 20 \cdot \left[ \frac{12}{24 - 9} \right] =$$

$$= 230 + 16 = 246 \text{ meses}$$

# Medidas de dispersão ou variabilidade

## A Amplitude

$$h = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

$$h = 370 - 230 = 140 \text{ meses}$$

## O Desvio Médio Absoluto

Neste caso, o dma será dado por:

$$\begin{aligned} \text{dma} &= \frac{f_1|x_1 - \bar{x}| + f_2|x_2 - \bar{x}| + \dots + f_k|x_k - \bar{x}|}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \\ &= \frac{\sum f_i \cdot |x_i - \bar{x}|}{n} \end{aligned}$$

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$f_i \cdot  x_i - \bar{x} $
240	12	12 \cdot  240 - 285,20  = 542,40
260	9	9 \cdot  260 - 285,20  = 226,80
280	8	8 \cdot  280 - 285,20  = 41,60
300	7	7 \cdot  300 - 285,20  = 103,60
320	6	6 \cdot  320 - 285,20  = 208,80
340	5	5 \cdot  340 - 285,20  = 274,00
360	3	3 \cdot  360 - 285,20  = 224,40
<b><math>\Sigma</math></b>	<b>50</b>	<b>1621,60</b>

O dma será, então:

$$\begin{aligned} \text{dma} &= \frac{\sum f_i \cdot |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{1621,60}{50} = \\ &= 32,43 \text{ meses} \end{aligned}$$

## A Variância

Neste caso, a variância será:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{f_1(x_1 - \bar{x})^2 + f_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_k(x_k - \bar{x})^2}{n} = \\ &= \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \end{aligned}$$

## Exemplo

$x_i$	$f_i$	$f_i \cdot x_i^2$
240	12	$12 \cdot 240^2 = 691200$
260	9	$9 \cdot 260^2 = 608400$
280	8	$8 \cdot 280^2 = 627200$
300	7	$7 \cdot 300^2 = 630000$
320	6	$6 \cdot 320^2 = 614400$
340	5	$5 \cdot 340^2 = 578000$
360	3	$3 \cdot 360^2 = 388800$
$\Sigma$	<b>50</b>	<b>4 138 000</b>

A variância será, então:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \\ &= \frac{4138000}{50} - 285,20^2 = \\ &= 1420,96 \text{ meses}^2 \end{aligned}$$

## O Desvio Padrão

O desvio padrão será dado por:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{1420,96} = \\ &= 37,6956 \cong 37,70 \text{ meses} \end{aligned}$$

## O Coeficiente de Variação

Dividindo o desvio padrão pela média, tem-se o coeficiente de variação:

$$g = \frac{37,695623}{285,20} = 13,22\%$$

# Medidas de Assimetria (Distorção)

*Skewness*

## Primeiro Coeficiente ( de Pearson)

$$a_1 = (\text{Média} - \text{Moda}) / \text{Desvio Padrão}$$

## Segundo Coeficiente ( de Pearson)


$$a_2 = 3 \cdot (\text{Média} - \text{Mediana}) / \text{Desvio Padrão}$$

## Coefficiente Quartílico



$$CQA = [(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)] / (Q_3 - Q_1)$$

## Coefficiente do Momento

$$a_3 = m_3/s^3, \text{ onde } m_3 = \Sigma(X - \bar{X})^3/n$$





## Coefficiente = 0 Conjunto Simétrico





## Coefficiente < 0

### Conjunto: Negativamente Assimétrico



## Coefficiente > 0

### Conjunto: Positivamente Assimétrico





# Medidas de Achatamento ou Curtose


(Kurtosis)

## Coefficiente de Curtose (momentos)

$$a_4 = m_4/s^4, \text{ onde } m_4 = \Sigma(X - \bar{X})^4/n$$




**Coefficiente = 3 ou 0**  
**Conjunto: Mesocúrtico**




**Provão 2000**  
**Curso: Odonto**

**Coefficiente > 3 ou (> 0)**  
**Conjunto: Leptocúrtico**



**Provão 2000**  
**Curso: Matemática**

**Coefficiente < 3 ou (< 0)**  
**Conjunto: Platicúrtico**



**Provão 1999**  
**Curso: Eng. Civil**

# Propriedades das Medidas

**Se**  $y = ax + b$

Então:

$$\bar{y} = a\bar{x} + b$$

$$s_y^2 = a^2 s_x^2$$

$$s_y = |a| s_x$$